Zarządzenie nr 1/2018

Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

z dnia 3 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia procedury stosowania środków ochrony osobistej

§ 1

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się procedurę stosowania środków ochrony osobistej.

§ 2

Procedura jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 r.

Prezes Zarządu

Ewa Wieja

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 z dnia 3.I.2018
Prezesa Szpitala w Puszczykowie

SZPITAL W PUSZCZYKOWIE	PROCEDURA STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ	WYDANIE : I QP CMJ – KZ 1.7	STRONA: Strona | 1
		OBOWIĄZUJE OD: 15.01.2018	

	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ	Specjalista ds. epidemiologii Specjalista bhp	Bożena Nowaczyk Monika Lorenz Arleta Ratajczak	18.12.2017	Bożena Nowaczyk Monika Lorenz Arleta Ratajczak
SPRAWDZIŁ	z-ca Dyrektora ds. Medycznych	Maria Karczewska	18.12.2017	Maria Karczewska
ZATWIERDZIŁ	Prezes	Ewa Wieja	29.12.2017	E. Wieja

1. **Cel procedury**

   Określenie zasad stosowania środków ochrony osobistej

2. **Terminologia:**

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (PPE) - Środki ochrony osobistej obejmują maski, rękawiczki, odzież ochronną, itp. powinny być stosowane przez personel medyczny w sytuacjach, w których istnieje ryzyko kontaktu z czynnikami zakaźnymi.

MASKI OCHRONNE – powinny być stosowane przez personel w przypadku kiedy istnieje ryzyko zagrożenia drogą oddechową. Zaleca się stosowanie właściwych masek ochronnych w zależności od wielkości cząsteczek bioaerozolu i grupy ryzyka, do której zaliczany jest określony czynnik mikrobiologiczny. Symbole klasy ochronnej (P1, P2, P3) oznaczają:

- P1 – mały stopień ochrony
- P2 – średni stopień ochrony
- P3 – duży stopień ochrony.

ODZIEŻ OCHRONNA - zapobiega kontaktowi powierzchni skóry człowieka z mikroorganizmami, wywierającymi szkodliwy wpływ na organizm ludzki, oraz ich strukturami. Podczas doboru odzieży należy najpierw uwzględnić grupę, do której należy czynnik biologiczny. Następnie należy ustalić rodzaj wykonywanej przez pracownika czynności (praca w laboratorium, wykonywanie zabiegów medycznych) oraz określić natężenie czynnika biologicznego.

OBUWIE:

- **operacyjne** ze względów medycznych powinno odpowiadać normom higienicznym, aby mogło być poddawane rutynowemu codziennemu myciu ręcznemu lub termicznemu w maszynie myjąco-dezynfekującej i w razie potrzeby dezynfekcji .
- **ochronne** ze względu na bezpieczeństwo pracy obuwie powinno być antyelektrostatyczne i mieć zabezpieczenie przed poślizgiem. Powinno także być wygodne i stabilne. Kryterium określającym konieczność stosowania obuwia

© SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S. T. DĄBROWSKIEGO" SPÓŁKA AKCYJNA

chroniącego przed czynnikami biologicznymi jest występowanie na podłożu cieczy, zawierającej niebezpieczne czynniki biologiczne, lub zagrożenie polaniem nóg taką cieczą.

SPRZĘT OCHRONNY OCZU I TWARZY - do ochrony przed cieczami, aerozolami lub parami, zawierającymi niebezpieczne czynniki biologiczne, może być stosowany sprzęt ochronny w postaci osłon twarzy lub gogli. Gogle oraz osłony twarzy powinny też spełniać wymagania, dotyczące odporności na działanie środków dezynfekcyjnych, a ich konstrukcja powinna być pozbawiona elementów umożliwiających gromadzenie się aerozoli biologicznych.

3. **Odpowiedzialność i uprawnienia:**

Personel komórek: stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z zasadami zawartymi w procedurze

Ordynator/Kierownik/ Koordynator Oddziału, Pielęgniarka Oddziałowa /Koordynator Oddziału : bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem zasad

Specjalista BHP, Specjalista ds. epidemiologii:

- szkolenie personelu w zakresie stosowania środków ochrony osobistej
- prowadzenie kontroli przestrzegania zasad zawartych w procedurze
- dobór środków ochrony osobistej

4. **Zakres stosowania :**

Personel Szpitala w Puszczykowie

5. **Sposób postępowania oraz odpowiedzialność:**

Lp.	Opis postępowania	Odpowiedzialność
1.	Środki ochrony osobistej dostępne są w gabinetach zabiegowych, bloku operacyjnym, pomieszczeniach do izolacji)	Pielęgniarka Oddziałowa
2.	1.Środki ochrony osobistej stosuj w sytuacji, kiedy istnieje ryzyko kontaktu z czynnikami zakaźnymi. 2.**Kolejność zakładania PEE:** • fartuchy • maska filtrująca lub chirurgiczna • gogle lub przyłbica • rękawice	Personel szpitala

© SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S. T. DĄBROWSKIEGO" SPÓŁKA AKCYJNA

	1. Kolejność zdejmowania PEE: • rękawice • gogle lub przyłbica • fartuchy • maska filtrująca lub chirurgiczna	
3.	**1. Jednorazowe rękawiczki medyczne:** • nałóż bezpośrednio przed kontaktem i zdejmij zaraz po kontakcie z pacjentem • po użyciu wyrzuć do pojemnika z czerwonym workiem • dezynfekuj ręce przed założeniem i po zdjęciu rękawic, rękawice nie są środkiem zastępczym w odniesieniu do higieny rąk • zmieniaj rękawice pomiędzy różnymi pacjentami albo między wykonywaniem różnych czynności u tego samego pacjenta **2. Jałowe rękawiczki jednorazowe stosuj do:** • procedury chirurgicznej • odbierania porodu, • inwazyjnej procedury radiologicznej • założenia i procedur związanych z dostępem naczyniowym (linie centralne) • przygotowania żywienia pozajelitowego **3. Niejałowe rękawiczki jednorazowe stosuj:** • kiedy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi, wydzielinami i wydalinami, czy przedmiotami wizualnie zabrudzonymi płynami ustrojowymi	Personel szpitala

© SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S. T. DĄBROWSKIEGO" SPÓŁKA AKCYJNA

	• w trakcie kontaktu z pacjentem w izolacji kontaktowej • W trakcie pracy z detergentami, płynami dezynfekcyjnymi i koncentratami środków dezynfekcyjnych	
4.	1. **Odzież ochronną** stosuj i oddawaj do prania, firmie pralniczej z którą szpital ma podpisaną umowę każdorazowo po zabrudzeniu materiałem biologicznym lub substancją chemiczną itp. 2. **Bieliznę operacyjną** stosuj na bloku operacyjnym i w salach zabiegowych i oddawaj do prania firmie pralniczej z którą szpital ma podpisaną umowę każdorazowo po zabrudzeniu materiałem biologicznym 3. **Fartuchy flizelinowe i plastikowe** stosuj: • w sytuacji, gdy może dojść do skażenia odzieży drobnoustrojami lub materiałem zakaźnym, np. podczas usuwania zawartości ssaków, butli drenażowych, worków moczowych, basenów itp. • w celu ochrony odzieży przed zamoczeniem np. podczas kąpieli lub mycia chorych, czyszczenia aparatury i sprzętu medycznego • w celu ochrony pacjentów szczególnie podatnych na zakażenie podczas pielęgnacji i zabiegów • przed wejściem do izolatki, zwłaszcza wtedy, gdy planujesz wykonywanie czynności bezpośrednio przy chorym • przed kontaktem z potencjalnie skażonymi przedmiotami (szczególni wtedy gdy pacjent ma biegunkę, założoną kolostomię lub ileostomię,	Personel szpitala

© SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S. T. DĄBROWSKIEGO" SPÓŁKA AKCYJNA

	zastosowano drenaż rany nie przykryty opatrunkiem) • Należy je zdjąć natychmiast po użyciu zrywając pasek z szyi i talii i wyrzucić do pojemnika wyłożonego czerwonym workiem	
5.	**1. Maski ochronne i przyłbice stosuj:** • aby ochronić się przed wdychaniem patogenów przenoszonych drogą powietrzną • zawsze przy bliskim kontakcie z chorym (odległość mniejsza niż 1m) przy **izolacji powietrzno-kropelkowej (D)** • w przypadku **izolacji powietrzno - pyłowej (A)** wchodząc na salę załóż maskę z filtrem Hepa, spełniającą wymogi CDC (ponad 95% skuteczności) Maski z filtrem Hepa dostępne są w magazynie oraz na oddziale ratunkowym i intensywnej terapii • w przypadku kontaktu z areozolem koncentratów środków dezynfekcyjnych **2. Rodzaje masek i sposób postępowania po użyciu:** • nie sterylne z filtrem i bez filtra każdorazowo po zabrudzeniu i splamieniu usunąć do pojemnika wyłożonego czerwonym workiem • przyłbice po wykonanej czynności należy – zdezynfekować, przemyć i wysuszyć	Personel szpitala
6.	**1. Okulary i gogle ochronne stosuj:** • gdy istnieje prawdopodobieństwo powstania aerozoli, rozpryśnięcia krwi lub płynów ustrojowych • w trakcie pracy z płynami dezynfekcyjnymi lub ich oparami	Personel szpitala

© SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S. T. DĄBROWSKIEGO" SPÓŁKA AKCYJNA

	2. Sposób postępowania: • każdorazowo po zabrudzeniu należy je zdezynfekować przez zanurzenie lub przetarcie, wymyć, wypłukać i wysuszyć	
7	**Buty operacyjne wielorazowe stosuj:** • gdy istnieje prawdopodobieństwo rozpryśnięcia krwi lub płynów ustrojowych • w trakcie pracy z płynami dezynfekcyjnymi	Personel szpitala

7. Dokumenty związane z Procedurą/Instrukcją:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008,234,1570)
2. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2004, nr 3(41), s. 53–60
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Procedura higieny rąk symbol: QP-001/HS; CMJ – KZ 1.2

© SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S. T. DĄBROWSKIEGO" SPÓŁKA AKCYJNA