schülke

Roztwór służący do czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran

octenilin® roztwór do irygacji ran

Zalety

- pełna zgodność chemiczna oraz farmakologiczna z lekiem octenisept®,
- doskonała skuteczność czyszcząca,
- bardzo wysoka tolerancja tkankowa,
- bezbolesne zastosowanie,
- jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów ran,
- preparat zachowuje swoje właściwości przez 8 tygodni po otwarciu opakowania,
- doskonale usuwa biofilm bakteryjny,
- zawiera octenidynę

Obszary zastosowania

- szybkie i skuteczne oczyszczenie rany,
- docieranie w trudno dostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia),
- usunięcie skrzepów składających się z biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i znekrotyzowanej tkanki,
- nawilżenie rany i wytworzenie idealnych warunków dla jej gojenia,
- utrzymanie wilgoci opatrunków,
- bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków przyschniętych lub pokrytych skrzepem

Własciwości produktu

Właściwości nawilżające: dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu, roztwór octenillin® cechuje się doskonałymi właściwościami nawilżającymi, przez co skutecznie oczyszcza rany, w tym trudne do oczyszczenia rejony, takie jak kieszonki czy wgłębienia ran. Preparat nie powoduje podrażnienia ani uczulenia. Jego użycie jest bezbolesne i nietoksyczne w stosunku do tkanki. Nie stwierdzono zaburzeń ziarninowania oraz nabłonkowania.

Wysoka tolerancja na octenillin® została potwierdzona próbami klinicznymi na ranach przewlekłych oraz wieloletnim, klinicznym doświadczeniem.

Wskazówki dotyczące stosowania

Intensywnie przemywać ranę z użyciem roztworu octenillin® za każdym razem, gdy dokonywana jest zmiana opatrunku (przed użyciem, możliwe jest ogrzanie roztworu do temperatury ciała). W ten sposób można usunąć przyschnięte do rany opatrunki. Do rozpuszczenia powłok fibrynowych pokrywających ranę można użyć opatrunków nasączonych octenillin®. Czynność należy powtarzać, aż do widocznego usunięcia powłok fibrynowych oraz tkanek nekrotycznych. Po wykonaniu tego zabiegu, nie ma potrzeby dalszego przemywania rany. Jeśli to konieczne, rana może zostać pokryta żelem na rany octenilin® żel na rany. W sytuacji podejrzenia oznak infekcji lub samej infekcji należy zastosować lek octenisept®.
Sposób użycia na przyschniętych, trudnych do zdjęcia opatrunkach:
Jeśli opatrunek na ranie jest trudny do zdjęcia, zalecane jest namoczenie go roztworem do irygacji rany octenillin®. Powinno to umożliwić zdjęcie takiego opatrunku bez naruszenia powierzchni rany.

CE 0297

octenilin® roztwór do irygacji ran

Dane produktu

Preparat zawiera: oktenidyny dichlorowodorek, etyloheksylogliceryna, glicerol, woda oczyszczona.

Dane chemiczno-fizyczne	
Forma	ciecz
Gęstość	ok. 1,0 g/cm3 / 20 °C
Kolor	bezbarwny
pH	ok. 5,4 / 20 °C / (nierozcieńczony)
Temperatura zapłonu	nie dotyczy

Wskazówki szczególne

Stabilny w temperaturze pokojowej. Najlepiej użyć przed: upływem 8 tygodni od pierwszego użycia. Butelkę zamykać po każdym użyciu. Efekty uboczne: nie stwierdzono.
Ponieważ nigdy nie można całkowicie wykluczyć możliwości alergii, nie zaleca się stosowania octenillin® przez osoby, u których zachodzi przypuszczenie, że mogą być uczulone na któryś ze składników preparatu. Preparatu nie należy stosować na chrząstki szkliste.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

- stosować tylko zewnętrznie, nie wprowadzać do tkanki pod ciśnieniem,
- nie wstrzykiwać ani nie prowadzić wlewu,
- nie połykać,
- używać preparatu znajdującego się tylko w nieuszkodzonych butelkach,
- nie wystawiać na działanie słońca
- chronić przed dziećmi,
- nie stosować po upływie terminu ważności

Nie stosować po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
OCTENILIN roz. do irygacji ran350ml FL	10/Karton	121701

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GMBH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT REG.-NR. D-150-00003

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

AIR LIQUIDE Healthcare Przedsiębiorstwo należące do grupy Air Liquide

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Rydygiera 8
01-793 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 568-22-02
Telefax +48 0 22 568-22-04
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.pl

Prodmiot odpowiedzialny
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

910826-PL-pl-01-06 1/2015
Informacje dotyczące produktu nie są automatycznie aktualizowane